

Aus dem Institut für gerichtliche und soziale Medizin
der Universität Bonn.

Direktor: Prof. Dr. Pietrusky.

Über die Bestimmung des Alkohols im Blut, insbesondere im Serum und Blutkuchen.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

zu Bonn.

Vorgelegt am 20. November 1936

von

Rudolf Balensiefen

aus Eudenberg (Siegkreis).

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Pietrusky.



Meinen lieben Eltern

in Dankbarkeit!





Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41546416_0143

A. Die Bedeutung des Alkoholnachweises im Blut und die Bestimmungsmethoden.

In den letzten Jahren hat der Kraftwagenverkehr in einem erheblichen Maße zugenommen. Gerade in Deutschland ist durch die Aufhebung der Kraftfahrzeugsteuer für neue Wagen die Zahl der zugelassenen Wagen in den beiden letzten Jahren enorm gestiegen. Leider ist mit der Zunahme des Kraftwagenverkehrs auch eine starke Zunahme der Verkehrsunfälle zu verzeichnen. Man sucht vielfach die Ursache mit gewissem Recht darin zu erblicken, daß die alten, oft engen Straßen mit unübersichtlichen Kurven dem modernen Autoverkehr ganz und gar nicht mehr gerecht werden. Das Autostraßennetz, das in den nächsten Jahren in Deutschland weiter ausgebaut und vollendet wird, wird mit dazu beitragen, die Zahl der Unfälle einzuschränken. Als vermeintliche Ursache wurde auch die in Städten erlaubte unbegrenzte Höchstgeschwindigkeit nach der am 1. 10. 34 in Kraft getretenen neuen Reichsstraßenverkehrsordnung vom 28. 5. 1934 angesehen. Doch haben nach G. Jungmichel (1) die statistischen Erhebungen für die Zeit vom 1. 10. 1934 bis 1. 1. 1935 für München kein gleichwertiges Ansteigen gegenüber dem Gesamtdurchschnitt der Unfälle in der vorhergehenden Zeit gezeigt. Wie weit die inzwischen eingesetzte motorisierte Straßenpolizei zur Verhütung von Unfällen beitragen wird, läßt sich noch nicht vorhersehen.

Es ist aber auch eine feststehende Tatsache, daß der Alkoholgenuß einen großen Teil der Verkehrsunfälle verursacht. Nach einer Angabe von F. Goebel (2) schätzt Hartwig den Anteil der durch Alkohol verursachten Unfälle in ganz Deutschland auf 10%, das sind ungefähr 30 000 Unfälle. Die Zahl der tödlichen Unfälle, die unter Alkoholeinwirkung zustandekommen, berechnet aus der Gesamtzahl der tödlichen Unfälle, wird noch höher als 10% geschätzt. Im Jahre 1932 betrug die Anzahl der tödlichen Verkehrs-

unfälle insgesamt im ganzen Deutschen Reich 6872 laut Auskunft des statistischen Landesamts Bayern (G. J u n g m i c h e l) (1). In der Reichsstatistik ist nur die Zahl der Verkehrsunfälle enthalten, aber nicht die Ursache derselben. Wenn die Polizeiverwaltungen „offenbare“ Trunkenheit als Ursache für einen Unfall angeben, so lag meist eine solche Betrunkenheit vor, daß es geradezu einem Verbrechen gleichkam, in diesem Zustand ein Fahrzeug zu führen. Doch sind es meist nicht die hohen Grade von Trunkenheit, die Verkehrsunfälle verursachen, da so stark unter Alkoholwirkung stehende Personen meist nicht mehr in der Lage sind, ein Fahrzeug zu führen, oder von anderen weniger alkoholbeeinflussten oder nüchternen Personen an der Führung eines Fahrzeuges gehindert werden; wohl dürften sie als Fußgänger oft genug Anlaß zu Verkehrsunfällen geben, wobei sie dann meist nur selbst das Opfer eines solchen bleiben. Doch gerade die geringeren Alkoholmengen sind es, die einen großen Teil der Fahrer, besonders die jüngeren, kühner und unvorsichtiger machen, sie zu Wettfahrten und Schnelligkeitsrekorden antreiben, bei denen es dann so häufig zu Unfällen kommt. Eine bekannte Ursache sind auch die berüchtigten Schwarzfahrten, verbunden mit dem Besuch von Gaststätten. Bei den heute stets zunehmenden Fahrgeschwindigkeiten und dem großen Umfang des Verkehrs wird von dem Fahrer eine besonders hohe Aufmerksamkeit, Umsichtigkeit und in plötzlich kritischen Lagen schnelles Handeln gefordert. Dies bedeutet eine große körperliche wie auch geistige Leistung. Es ist bekannt, daß diese Leistungsfähigkeit schon durch geringe Alkoholmengen herabgemindert wird, eine Verlängerung der Reaktionszeit mit sich bringt, zu Müdigkeit, Zerstreuung oder körperlichem Unwohlsein führt. Allerdings steigern, meist jedoch nur scheinbar, in einigen Fällen geringe Alkoholmengen die Leistungsfähigkeit mancher Menschen, wobei jedoch die Grenze zwischen Leistungsfähigkeit und Wegfall von Hemmungen rasch überschritten und somit wieder zur Unfallsursache wird.

Unsere deutsche Statistik kann noch keinen Aufschluß über die wirklichen Zusammenhänge von Unfall und Alkohol geben, da nicht einheitlich bei allen Unfällen und allen betroffenen Personen

die notwendigen Untersuchungen vorgenommen werden. Die geeignetste Untersuchung ist bis jetzt aber zweifellos der Nachweis von Alkohol im Blut. Solche Blutalkoholuntersuchungen werden hier in Deutschland planmäßig bei allen Unfällen in neuester Zeit in München, Leipzig und Berlin durchgeführt. Auch das Bonner Institut für gerichtliche und soziale Medizin hat alle Polizeistationen, soweit sie in seinen Bereich gehören, darauf hingewiesen, bei allen Verkehrsunfällen Blutproben entnehmen zu lassen, die dann im Institut untersucht werden. Dieser Hinweis ist von den zuständigen Polizeibehörden aufgenommen worden, so daß die Blutalkoholuntersuchung in der Rheinprovinz als praktisch durchgeführt angesehen werden kann, obwohl eine dienstliche Anweisung an die Polizeistationen noch nicht ergangen ist.

In Schweden werden solche Untersuchungen schon seit Anfang 1930 einheitlich ausgeführt. Hier hat kürzlich Hindmarsch (zit. bei G. Jungmichel) (1) „im Zeitraum eines Jahres an 283 Verkehrsunfällen eine Untersuchung auf Alkohol angestellt; dabei hat er sogar gefunden, daß 41% von diesen 283 Unfällen innerhalb fünf Stunden nach dem Unglücksfall Alkohol im Blut hatten und von diesen 41% hatten nicht weniger als 64% über 1‰ Alkoholgehalt im Blut“.

Und nach einer dänischen Statistik: „Von 400 Untersuchten zeigten 23 v. H. Volltrunkenheit, 61 v. H. leichte Alkoholwirkungen beim Unfall, 16 v. H. waren nüchtern“ (Kriebs) (3).

Diese Statistiken geben also ein aufschlußreiches Bild von dem Zusammenhang zwischen Alkohol und Unfall.

Nach der früheren Bestimmung in dem Reichskraftfahrzeugverkehrsgesetz vom 10. 5. 1932 im § 17 Abs. 2 durfte, wer unter der Wirkung von geistigen Getränken steht und infolgedessen zur sicheren Führung nicht imstande ist, ein Kraftfahrzeug nicht führen.

Die neue am 1. 10. 1934 in Kraft getretene Reichsstraßenverkehrsordnung mit Ausführungsanweisung hat diese Bestimmung in folgende Fassung gebracht: „Ungeeignet im Verkehr ist insbesondere, wer unter erheblicher Wirkung geistiger Getränke oder Rauschgifte Fahrzeuge oder Tiere geführt oder sonst gegen verkehrsrechtliche Vorschriften erheblich verstoßen hat“ (zu § 1, Abs. 3).

Ähnliches befagt die Verkehrsordnung vom 1. 4. 1934 in Preußen: „Ungeeignet sind insbesondere Personen, die unter der Wirkung geistiger Getränke oder Rauschgifte stehen — (§ 8[1]).

Neben den eigentlichen Verkehrsunfällen, die wohl am meisten in Betracht kommen, sind es auch alle anderen Betriebsunfälle, Raufhändel und Körperverletzungen, bei denen der Alkohol als ursächliches Moment in Frage kommt. Es sei hier darauf hingewiesen, daß es in der Rechtsprechung eine Rolle spielen kann, ob der Alkoholrausch als Unfallsurfache oder Unfallsbedingung anzusehen sei. Wenn hier Alkoholrausch als Unfallsurfache bezeichnet wird, so ist unter „Urfache“ meist nicht causa, sondern conditio (Bedingung) zu verstehen.

Da die meisten Unfälle durch ihre Folgen auch in Lebensverhältnisse eingreifen, gewinnen sie zivil-, versicherungs- und strafrechtliche Bedeutung. Es gilt daher bei jedem Unfall möglichst einwandfrei die Schuldfrage zu klären. Doch scheitert nicht selten die Klärung der Schuldfrage an den Beweismitteln. Besonders wenn Trunkenheit als Urfache für den Unfall in Frage kommen könnte, sind die Zeugenaussagen oft so verschieden, ja widersprechend, daß sie vor Gericht unverwertbar sind. Es heißt dann: „Ja, der Fahrer hat wohl getrunken, aber er war nicht betrunken“, oder „er war angeheitert, aber nicht betrunken“, oder „er kann sehr viel vertragen ohne betrunken zu werden“, oder „er war zwar betrunken, wußte aber noch genau was er tat“. Auf einzelne Berausungssymptome können sich die Zeugen oft nicht mehr besinnen. Es werden schließlich Lokaltermine anberaumt und die Unfallvorgänge am Tatort rekonstruiert, wobei es denn auch nicht immer zu einer Klärung der Schuldfrage kommt. Insbesondere kann der Lokaltermin zur Bestätigung einer vom Zeugen vorgebrachten Trunkenheit des Fahrers nur wenig, meist wohl nichts beitragen.

Die psychisch-klinische Prüfung, die der Arzt sofort nach dem Unfall mit dem Fahrer vornehmen kann und soll, dürfte schon eher ein richtiges Urteil über den Grad der Trunkenheit und über die Frage, ob überhaupt Alkoholbeeinflussung vorliegt, zutage fördern. Diese Prüfung erstreckt sich hauptsächlich auf einige wesentliche Berausungssymptome. Als wichtigstes erscheint wohl die Feststellung

des Alkoholgeruches in der Atemluft. Ist jedoch der Alkoholgeruch durch Nikotingeruch überdeckt, oder hat der Arzt selbst vorher Alkohol genossen, so läßt sich Alkoholgeruch in der Atemluft des Betroffenen nicht oder nur schwer feststellen. Insbesondere kann der Arzt sich kein Urteil über den Grad der Trunkenheit aus der Atemluft erlauben, da, wie G. Jungmichel (1) ganz richtig erwähnt, „nach Genuß auch nur eines Glases Bier die Atemluft ebenso nach Alkohol riecht wie nach Genuß von 10 Glas Bier“. Auch die anderen Symptome wie Rombergsche Probe, Unsicherheit des Ganges beim Gehen und Wenden, Finger-Finger-Probe, das Auffammeln von kleinen Gegenständen und lallende Sprache sind sehr unsicher, zumal wenn man die „plötzliche Ernüchterung“ in Betracht zieht, die ja erwiesenermaßen bei plötzlichen eindrucksvollen Erlebnissen (Verkehrsunfall, polizeiliche Verhaftung, ärztliche Untersuchung, Sturz in kaltes Wasser usw.) eintreten kann. Überdies weist Widmark (4) auf mehrere Fälle hin, in denen Ärzte nach der psychisch-klinischen Prüfung die Diagnose „alkoholbeeinflusst“ nicht stellten, während die nachträgliche chemische Blutuntersuchung einen sehr hohen Alkoholgehalt des Blutes aufwies (über 2‰).

Ist nun ein Unfall auf einer entlegenen Strecke vorgekommen, der Betroffene oder alle Betroffenen dabei tödlich verunglückt, so sind überhaupt keine Zeugen vorhanden und man ist zur Klärung der Ursache auf andere Untersuchungen angewiesen, insbesondere wenn Alkoholbeeinflussung den Unfall verursacht haben könnte.

Die moderne Rechtsprechung zieht immer mehr und mehr exakt begründete naturwissenschaftliche Methoden zur objektiven Urteilsfindung heran. Es lag nahe, zu diesem Zwecke auch den Alkohol, und zwar seine genaue Menge, im menschlichen Körper zu bestimmen und Rückschlüsse auf den Grad der Berausung zu ziehen. Mit makro- und mikrochemischen Methoden bestimmt man heute sehr exakt die Alkoholkonzentration in den einzelnen Körperflüssigkeiten und Organen. Im Vordergrund steht dabei der Nachweis von Alkohol im Blut, um den sich besonders E. Widmark, G. Jungmichel und E. Kriebs verdient gemacht haben.

Aus dem Nachweis von Alkohol im Harn lassen sich keine sicheren Rückschlüsse auf den Berauschungsgrad stellen, wie E. W i d m a r k (4) gezeigt hat. War der Harn nicht gut alkalisch, so erhält man unter Umständen bedeutend zu hohe Werte für die Alkoholkonzentration. Im allgemeinen liegt die Alkoholkonzentration im Harn 15—20% höher als im Blut (Vollblut), sie entspricht ungefähr der des Blutplasmas, denn im Blutplasma ist ein etwas höherer Wert als in den roten Blutkörperchen (W i d m a r k) (4). Wenn R e n a u x (zit. bei K r i e b s) (3) den Vorschlag macht, die Harnalkoholbestimmung an Stelle der Blutalkoholbestimmung einzuführen, so wendet M i l e s (ebenda) mit Recht dagegen ein, daß die Übereinstimmung zwischen Harn- und Blutalkoholgehalt nur für die erste halbe Stunde zutrefte (und da sind die Harnalkoholwerte nach anderen Autoren noch unsicher); der Harnalkohol könne deshalb kein Maß für eine im Körper vorhandene Alkoholmenge abgeben (K r i e b s) (3).

Gestützt auf die Tatsache, daß der Alkoholgehalt des Gehirns der sicherste Maßstab für den Berauschungsgrad ist, hat G e t t l e r 1929 erklärt, zur Beurteilung einer Berausung sei nur die Alkoholkonzentration des Gehirns maßgebend. 1931 sprechen G e t t l e r und F r e i r e i c h dem Blutalkohol jeden Wert für eine Raufchbegutachtung ab (zit. bei K r i e b s). Sie stellten fest, daß zwischen dem Blutalkoholwert und dem Hirnalkoholwert keinerlei Gesetzmäßigkeit herrscht, daß dagegen der Konzentrationswert in der Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit (Liquor) immer etwas höher sei als der Alkoholkonzentrationswert des Gehirns, aber das Verhältnis beider Alkoholwerte sei so regelmäßig, daß aus einem bestimmten Liquorwerte der entsprechende Gehirnwert errechnet werden könne. Dabei wird der Alkohol im Gehirn und im Liquor bedeutend länger festgehalten als im Blut. Über die Verwertbarkeit dieses Verfahrens in der Praxis als Methode zur Blutalkoholbestimmung sei hier K r i e b s (3) angeführt: „Es wirft sich noch die Frage auf, ob die von G e t t l e r vorgeschlagene Alkoholprobe im Liquor gegenüber dem Alkoholnachweis im Blut so erheblich bessere Dienste für die Beurteilung eines Raufchzustandes zu leisten vermag, daß ihre Einführung in die gerichtliche Praxis ernsthaft in Erwägung

gezogen werden kann. Die Lumbalpunktion (Entnahme von Gehirnrückenmarksflüssigkeit mit der Spritze aus dem Rückenmarkskanal) ist schließlich kein Eingriff von alltäglicher Bedeutung; sie stellt besondere technische und medizinische Anforderungen an den Arzt, ist schmerzhaft und unter Umständen mit Gefahren für Leben und Gesundheit des Untersuchten verbunden. Auch bei fachgemäßer Entkeimung der Punktionsnadel und sorgfältiger Hautreinigung vor dem Einstich in den Rückenmarkskanal ist die Möglichkeit einer Infektion nicht mit Sicherheit auszuschließen. Nicht mit Unrecht dürfte in den meisten Fällen der Rauschverdächtige diesen weitgehenden Eingriff in seine körperliche Unversehrtheit als eine unbillige Zumutung zurückweisen; er wird dabei das volle Verständnis der Öffentlichkeit und des Gesetzgebers finden. . . . Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Liquorwerte den Vergiftungsgrad viel genauer und zutreffender bestimmen als die Blutalkoholwerte. Das längere Festhalten des Alkohols in der Gehirnzelle und im Liquor ermöglicht dazu auch geraume Zeit nach einem Unfall noch die Prüfung auf einen Rauschzustand. Man sollte anderseits nicht verkennen, daß die vielseitige und erfolgreiche Verwendung, die die Blutalkoholbestimmung bei einer großen Zahl namhafter, kritischer Forscher und Praktiker des In- und Auslandes gefunden hat, für den Wert der Blutprobe in der gerichtsmedizinischen Praxis spricht. Auch die Versuchsergebnisse dieser Untersuchung sprechen entschieden für die Brauchbarkeit der Alkoholbestimmung im Blut“.

Gestützt auf umfangreiche Versuche vieler Forscher ist so die Blutalkoholbestimmung in den Vordergrund getreten und findet in allen Ländern in immer größerem Maße in der gerichtsmedizinischen Praxis als sicherste Methode zur Feststellung der Alkoholberauschung Verwendung. Neben der Feststellung der Alkoholkonzentration im Blut erlangt die Blutalkoholbestimmung besondere Bedeutung, wenn es gilt die Nüchternheit (das ist Freisein von Alkohol), wie sie in bestimmten Berufen und Betrieben gefordert wird, nachzuweisen. So ist den Führern von Lokomotiven, Autoomnibussen, Straßenbahnen, Flugzeugen usw. völlige Enthaltksamkeit von alkoholischen Getränken während der Dienstzeit strengstens zur Pflicht gemacht. Auch die Reichspostverwaltung versteht unter „Nüchternheit“ im

Dienst, wie sie es von ihren Angestellten im Personen- und Güterkraftverkehr verlangt, „Frei sein von jeglichem alkoholischen Getränk“. Dagegen verlangt wohl auch die deutsche Reichsstraßenverkehrsordnung „Nüchternheit“ des Fahrers am Steuer des Motorfahrzeuges, wobei aber Nüchternheit nicht „Frei sein von Alkohol“ sondern nur „Nicht-Trunkenheit“ bedeutet.

Bei der Blutalkoholbestimmung wird der Alkoholgehalt im Blut bestimmt, der zur Zeit der Blutentnahme vorhanden war. Für die Beurteilung von Rauschzuständen können nun die Blutalkoholwerte nach abgeschlossenem Resorptionsvorgang und eingetretenem Diffusionsgleichgewicht herangezogen werden, vorausgesetzt, daß die einzelnen Blutalkoholkonzentrationen einen Gradmesser für die Stufen der Berausung bilden. Daß dieses in einem bestimmten Umfange der Fall ist, haben W i d m a r k (4) u. a. genügend nachgewiesen. Der Alkoholrausch ist bekanntlich die Reaktion des Zentralnervensystems auf die durch den Alkohol hervorgerufene Giftwirkung, die auf den Stoffwechselstörungen im Nervengewebe beruht. Es ist eine Erfahrungstatsache, daß gleich große Mengen Alkohol bei einzelnen Menschen und auch bei der einzelnen Person zu verschiedenen Zeiten verschiedene Wirkung zeigen, mithin auch die Blutalkoholkonzentration eine verschiedene ist.

Die Blutalkoholkonzentration ist einmal abhängig von der dem Körper pro Kilogramm zugeführten Menge absoluten Alkohols, zum anderen von dem in den einzelnen Körpergeweben verschiedenen Alkoholöfungsvermögen, das auf dem verschieden großen Wassergehalt der einzelnen Gewebe beruht. Daß dabei reichlicher Fettanatz eine wesentliche Rolle spielt, ist ersichtlich, wenn man die geringe Löslichkeit von Alkohol in Fett in Erwägung zieht.

Wesentlich abhängig ist die Blutalkoholkonzentration vom Zustand der Magenfüllung. Daß man nüchtern weniger Alkohol vertragen kann als nach einer guten Mahlzeit, ist bekannt. Bei vorher eingenommener Mahlzeit wird der Alkohol bedeutend langsamer resorbiert, so daß der Blutalkoholgehalt niedriger bleibt; dabei zeigt W i d m a r k (4) auch, daß ein geringer Teil der genossenen Alkoholmenge nachträglich nicht mehr nachweisbar ist und wahrscheinlich im Darmkanal oder während des Resorptionsvorganges ander-

weitig gebunden wird. Ob das ausschließlich eine Esterbildung ist, ist noch fraglich. Während G. J u n g m i e h l (1) glaubt feststellen zu können, je fettreicher eine Mahlzeit sei, desto weniger Alkohol werde vom Blut aufgenommen, beobachtet Simonin dagegen bei Alkoholgaben nach Verabreichung fetthaltiger Kost die gleichen Blutalkoholwerte wie nach Alkoholaufnahme aus nüchternem Magen. T u o v i n e n sagt, daß Fett wohl die Blutalkoholkonzentration niedriger halte, daß aber Eiweiß und Kohlehydrate in dieser Hinsicht bedeutend mehr Einfluß haben, auch bei Alkoholgenuß vor oder während der Mahlzeit (beide zit. bei K r i e b s).

Auch die Alkoholgewöhnung hat Einfluß auf die Blutalkoholkonzentration, insofern als die Resorption größer und schneller ist beim Gewöhnten.

Schließlich sind es zum Teil auch noch unbekannte Faktoren, die wohl mit dem vegetativen Nervensystem zusammenhängen, die für die Blutalkoholkonzentration mitbestimmend sind. Aus der Blutalkoholkonzentration in Volum-Promille läßt sich nun auch unter Berücksichtigung des Körpergewichts und eines bestimmten Faktors $= r$ die vorhandene Menge absoluten Alkohols im Körper zur Zeit der Blutentnahme berechnen, und bei Angabe der Zeiten unter Berücksichtigung eines weiteren Faktors $= \beta$ auch die z. B. zur Zeit des Unfalles vorhandene und noch weiter zurückgehend, die überhaupt genossene Menge absoluten Alkohols. Aus dieser kann man dann unter Zugrundlegung des Prozentgehaltes der einzelnen ortsüblichen Getränke die wirkliche Menge des getrunkenen Bieres, Weines, Branntweines usw. berechnen.

Unter dem Faktor r verstehen wir jenen Zahlenwert, der das Körpervolumen auf einen solchen Wert reduziert, in dem dann die Konzentration gleich der im Blute ist. (Daher Reduktionsfaktor). Dieser Faktor ist notwendig, da ja der Körper nicht nur aus Blut, sondern auch aus Knochen, Muskulatur, Fett usw. besteht, die einen weit geringeren Alkoholgehalt aufweisen als das Blut, an dem ja die Alkoholbestimmung vorgenommen wird.

Unter dem Faktor β verstehen wir den Zahlenwert für die Verbrennungsgeschwindigkeit des Körpers für Alkohol in Promille und Minute. (Konzentrationsabfall im Blut). Die Faktoren r und β sind

von E. W i d m a r k (4) gefunden und von G. J u n g m i c h e l (5) und R. K r i e b s (3) nachgeprüft worden.

Der Faktor r ist im allgemeinen niedriger bei Frauen; er ist gewissermaßen an die Konstitution gebunden, da athenische Personen ein hohes r , athletische ein mittleres und pyknische ein niedrigeres r haben. Der Faktor r ist jedoch nicht nur vom Körpergewicht und von der Körpertemperatur (Fieber erhöht den Wert für r), wie E. W i d m a r k (4) feststellt, sondern auch „der jeweilige körperliche und wohl auch seelische Gesamtzustand sind mitbestimmend für die Bildung dieses Faktors.“ (G. J u n g m i c h e l) (5).

Der Wert für den Faktor β ist ebenfalls nach E. W i d m a r k (4) von der Menge und der Konzentration des genossenen Alkohols unabhängig; er wird von inneren konstitutionellen Momenten bestimmt. Nach G. J u n g m i c h e l (5) weist aber auch der Konzentrationsabfall für dieselbe Person Veränderlichkeit auf. Im übrigen können nach ihm: „Für die Zunahme (von β) kurz zusammengefaßt ausschlaggebende Bedeutung haben: körperliche wie geistige Frische, regelmäßiger Genuß von Alkohol oder chemisch-ähnlicher Stoffe. Als Ursache für die Abnahme von β sind anzusehen: schlechtes körperliches wie geistiges Allgemeinbefinden, Alkoholabstinenz, Menstruation, Rekonvaleszenz, Krankheit.“ Während allgemein feststeht, daß Alkoholgewöhnung den Wert für β steigert, hat R. K r i e b s (3) jedoch keinen gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen Gewöhnung und Abbaugeschwindigkeit für Alkohol finden können.

Da für die Praxis bei der Beurteilung der Alkoholeinwirkung fast nur Männer in Betracht kommen, seien hier die für Männer gefundenen Werte für r und β wiedergegeben:

Bei E. W i d m a r k (4):	r	β
Höchst	0,86	0,24
Mittel	0,68	0,15
Niedrigst	0,51	0,08
Bei G. J u n g m i c h e l (5):		
Höchst	0,85	0,17
Mittel	0,76	0,12
Niedrigst	0,64	0,09

Im menschlichen Körper werden also pro Stunde an reinem Alkohol umgesetzt (also verbrannt) bei Männern durchschnitt-

lich 7 Gramm, bei Frauen etwa 5 Gramm. Alkoholgewöhnte Menschen können in der Stunde mehr, etwa bis 10 Gramm reinen Alkohol verbrennen.

Normalerweise kommt im Blut Alkoholkonzentration bis zu $0,03\text{‰}$ vor, als natürlicher Alkoholgehalt des Blutes. Unter $0,5\text{‰}$ (Kriebs) (3) oder unter $0,8\text{‰}$ (Widmark) (4) liegen die Konzentrationen, bei denen man eine Alkoholbeeinflussung wohl ausschließen darf. Bei einer Konzentration über $2,6\text{‰}$ (Widmark) (4) liegt in jedem Fall sicherer Rauszustand vor. Ein Konzentrationswert von $5,0\text{‰}$ ist bereits eine lebensgefährliche Vergiftung. Zwischen $0,5\text{‰}$ und $2,6\text{‰}$ liegen nun alle die Stufen von „leicht angeheitert“ bis „stark betrunken“, in denen auch die persönliche Alkoholempfindlichkeit eine große Rolle spielt. Dabei hat sich allgemein gezeigt, daß das Maximum der Unfälle zwischen den Konzentrationswerten $1,0\text{‰}$ — $2,0\text{‰}$ liegt, und zwar zwischen $1,0\text{‰}$ bis $1,5\text{‰}$ für Kraftfahrer und zwischen $1,5\text{‰}$ — $2,0\text{‰}$ für Fußgänger (G. Jungmichel) (1).

Zur Feststellung des Berausungsgrades dürfte wohl der Konzentrationswert zur Zeit der Blutentnahme tatsächlich der brauchbarste sein, da die Faktoren r und β immerhin eine gewisse Fehlerquelle bieten. Um ein möglichst objektives Urteil über den Grad der Berausung zu gewinnen, oder besser gesagt die „Diagnose“ alkoholbeeinflußt oder nicht alkoholbeeinflußt stellen zu können, soll daher möglichst in jedem Falle neben dem chemischen Blutalkoholnachweis auch die psychisch-klinische Prüfung von seiten eines Arztes durchgeführt werden.

Zum Nachweis von Alkohol im Blut sind, abgesehen von einer großen Anzahl älterer ungeeigneter Verfahren, heute noch verschiedene Methoden im Gebrauch.

Die Nicloux-Methode (b. H. W. Nicolai) (6) stellt eine makrochemische Titrationsmethode dar, die im Prinzip auf der Reduktion von Chromsäureanhydrit in Chromoxyd beruht, wobei der Äthylalkohol zu Acetaldehyd und Essigsäure oxydiert wird.

Die Klauer-Methode (7), die auch hier im Institut angewandt wird, ist eine Modifizierung der Nicloux-Methode durch jodometrische Bestimmung des nicht verbrauchten Überschusses an

Kaliumbichromat. Durch die gleichzeitige Bestimmung einer Blindprobe mit der gleichen vorgelegten Bichromatmenge kann man dann die reduzierte Menge an Kaliumbichromat und damit auch die Menge des gefuchten Alkohols berechnen.

Das von R. M. M a y e r (8) angegebene Verfahren ist ebenfalls eine Modifikation der Nicloux-Methode, wie bei Klauer, nur mit dem Unterschied, daß er nicht wie Klauer Schwefelsäure in der Kälte zusetzt, sondern Phosphorsäure, nachdem Alkohol und Bichromat auf 100° erwärmt worden waren.

Die W i d m a r k - Methode (4) ist im Gegensatz zu den beiden vorher genannten Verfahren eine mikrochemische Bestimmung, die ebenfalls am hiesigen Institut, wie auch anderwärts, angewandt wird. Sie beruht im Prinzip ebenfalls auf der Bichromat-Methode. Als wichtige Neuerung aber bedient sie sich einer sehr vereinfachten Destillationsart sogleich in das Oxydans hinein. Mit Hilfe jodometrischer Methoden wird dann mittelbar die reduzierte Menge Kaliumbichromat bestimmt und aus dem sich ergebenden Verbrauch an n/100 Natriumthiosulfatlösung die gefuchte Alkoholmenge errechnet. (0,01 ccm Natriumthiosulfatlösung entspricht 1,13 γ Äthylalkohol.)

Neben diesen Methoden werden noch vielfach angewandt die die interferometrische Bestimmung des Alkohols im Blut nach K i o n k a , und die Methode von N i c o l a i (6), die eine Anwendung der ursprünglich von P r e g l herrührenden mikrochemischen Bestimmung der Äthoxylgruppe darstellt.

Bei der Mikromethode von E. W i d m a r k (4) wird das zu untersuchende Blut aus einer kleinen Stichwunde in der Fingerbeere oder im Ohr läppchen mit kleinen s-förmigen Kapillaren gewonnen. Diese Kapillaren fassen ungefähr 100 mg Blut und sind innen besonders präpariert, so daß Infektion verhütet und die Gerinnung gehemmt wird. Zu einer Blutalkoholbestimmung müssen mindestens 2, am besten 3 solcher Kapillaren gefüllt werden. Es darf nicht vorkommen, wie wir auch hier im Institut schon beobachten konnten, daß von den Ärzten nur eine und dazu noch schlecht gefüllte Kapillare eingefandt wird. Es kann immerhin vorkommen, daß eine Kapillare auf dem Transport oder beim Öffnen oder Ausblasen un-

brauchbar wird, so daß kein Material mehr zu einer Parallelbestimmung vorhanden ist; abgesehen davon, daß es bei den weittragenden Folgen, die sich unter Umständen aus diesen Bestimmungen für die Betroffenen ergeben können, eigentlich selbstverständlich ist, Paralleluntersuchungen anzustellen. Gerade der Vorteil der Widmarkprobe, nur mit einem Tropfen Blut auszukommen, ist auch insofern ein Nachteil, weil dabei Proben auf Aceton und andere flüchtigen Stoffe nicht ausführbar sind, die den Alkoholwert immerhin, wenn auch nur in geringem Umfange, beeinflussen.

Für die Makromethode wird das zu untersuchende Blut mit der Venüle oder Spritze aus der Armvene gewonnen. Da nur ganz selten einmal mit gerinnungshemmenden Mitteln verfehene Venülen verwandt werden, oder dem mit der Spritze entnommenen Blut Kaliumfluorid oder Natriumcitrat zugesetzt wird, so kommt fast ausnahmslos das Blut in geronnenem Zustand zur Untersuchung. Auch hier ergibt sich die Schwierigkeit, daß man keine Paralleluntersuchung ausführen kann. Ebenso ergeben sich auch Schwierigkeiten, wenn man nur eine ganz geringe Menge geronnenen Blutes hat, die zu klein ist, um eine Makromethode anzuwenden. Denn es kann, wie auch hier am Institut, vorkommen, daß eine Venüle mit knapp einem Kubikcentimeter geronnenem Blut eingefasst wird. Hier muß man aus dem Serum allein eine Widmarkprobe ausführen können, da man mit dem geronnenen Blut an sich keine Durchschnitsprobe nach der Methode v. Widmark mehr anstellen kann. Um überhaupt Paralleluntersuchungen zu ermöglichen, bleibt nichts anderes übrig, als den Blutkuchen oder das Serum auf Alkohol zu untersuchen.

Daher schien es notwendig, den Alkoholgehalt im Blutkuchen und im Serum einmal zu untersuchen und festzustellen, wie beide sich verhalten zum Alkoholgehalt des Gesamtblutes; ob hier bestimmte und gleichbleibende Beziehungen bestehen, die forensisch auswertbar sind.

Nach Beendigung der Untersuchungen veröffentlichte H. Elbel (9) eine Arbeit, in der er von Untersuchungen über das Ver-

hältnis des Alkoholgehaltes im Serum zum Alkoholgehalt im Vollblut berichtet. Hinsichtlich dieser Untersuchungen bedeutet diese Arbeit also eine Nachprüfung.

B. Übersicht über die Versuche.

1. Allgemeiner Gang und experimentelle Verbesserungen.

Bei den Versuchen, die zu dem Zwecke durchgeführt wurden, festzustellen, wie sich die Alkoholgehalte von Vollblut, Blutkuchen und Serum zueinander verhalten, wurde wie folgt vorgegangen: Die männlichen wie weiblichen Versuchspersonen erhielten eine bestimmte, verschieden große Menge 38%igen echten Weinbrandes, der in jedem Falle in 10—15 Minuten getrunken wurde. Nach 1 bis 1½ Stunde, in der im Körper wohl Diffusionsgleichheit eingetreten war, wurden dann aus je einer Armvene am rechten und linken Arm mit Venülen rasch hintereinander Blut entnommen. Die Hautstellen, wo die Punktionen ausgeführt wurden, wurden vorher mit Äther desinfiziert und etwas gewartet, bis der Äther verdunstet war. Es entstehen dadurch bei der Blutalkoholbestimmung keine Fehler; wenn auch J. Koller (10) ausdrücklich verlangt, daß die Haut nur mit Sublimat oder Oxycyanat desinfiziert werde. Inzwischen hat ja auch Elbel (9) eigens in Versuchen nachgewiesen, daß keine Fehler bei der Venenpunktion mit der Venüle entstehen, wenn die Haut mit Alkohol, Äther oder Jod desinfiziert wird, selbst dann nicht, wenn man durch die noch triefende nasse Haut einsticht. Wohl aber entstehen, wie man wohl auch leicht einsieht, Fehler, wenn die Haut mit erwähnten flüchtigen Stoffen desinfiziert wird und die Blutentnahme mit der Kapillare vorgenommen wird. Hierbei muß die Desinfektion stets mit Sublimat oder Oxycyanat geschehen.

Eine der Blutproben wurde dann zunächst sofort verarbeitet und aus ihr der Alkoholgehalt des Vollblutes nach der Klauer-Methode bestimmt. Die andere Blutprobe wurde bis nach vollständiger Gerinnung im Eischrank aufbewahrt. Dann wurden von dem klaren über dem Blutkuchen stehenden Serum zwei Widmark-Kapil-

laren gefüllt. Aus dem so gewonnenen Serum wurde mit der W i d m a r k - Methode der Alkoholgehalt des Serums bestimmt, wobei jedesmal der Mittelwert von den beiden Proben genommen wurde. Der Blutkuchen wurde verschieden behandelt. In einem Teil der Versuche wurde er auf einem Uhrgläschen nur ganz kurz mit destilliertem Wasser abgepült, und das restliche Wasser auf dem Uhrgläschen mit Fließpapier schnell und vollständig aufgesogen. Anschließend erfolgte Wägung. Ein Teil der Blutkuchen wurde länger, 2—3 Minuten, mit destilliertem Wasser auf dem Uhrgläschen ausgewaschen und einige wurden sogar vor dem Auswaschen der Länge nach aufgeschnitten. Aus dem Blutkuchen wurde wiederum mit der K l a u e r - Methode der Alkoholgehalt ermittelt. Bei einem Großteil der Versuche wurde nur der Alkoholgehalt des Vollblutes und des Blutkuchens festgestellt. Einige Versuche wurden auch so gehalten, daß das Blut nicht im Eischrank, sondern 12 und mehr Stunden bei Zimmertemperatur (Zeit der Versuche im Juli) aufbewahrt wurden, um so auch den natürlichen Verhältnissen, wie sie in der Praxis z. B. beim Versand durch die Post vorliegen, gerecht zu werden. Dabei wurde natürlich darauf geachtet, daß kein irgendwie schon faules Blut verwandt wurde.

Hier seien einige Bemerkungen zur Technik der Alkoholbestimmungen selbst gemacht. Bei dem K l a u e r - Verfahren verwenden wir hier im Institut zur ersten Destillation einen Claifen-Kolben, bei dem nach Angaben des hiesigen Institutschemikers Dr. K ü n k e l e direkt oberhalb des Halsanfatzes die Glaswandung des Halses an 4 bis 5 Stellen von außen nach innen eingedellt wird. Diese Dellen springen spitz und in ringförmiger Anordnung in das Lumen des Kolbenhalses vor, so daß sie hier als „Schaumbrecher“ dienen, wenn das Blut stark in großen Blasen schäumt. Die Zacken dürfen natürlich nur so weit in das Lumen hineinspringen, daß auch noch genügend Raum für die wasserdampfzuführende Röhre bleibt und daß keine Schwierigkeiten entstehen beim Ausleeren des Kolbens. Um das bislang so gefürchtete „Stoßen und Schäumen“ soweit als möglich zu verhüten, gibt Dr. K ü n k e l e mit besonderem Erfolg noch eine Flocke reinen Asbestes in den Kolben. So wurde bei der Destillation des Vollblutes nur ein einziges Mal bei ganz frischem Blut

störendes Schäumen beobachtet. Dagegen bei der Destillation der reinen Blutkuchen trat trotz Asbestes und Schaumbrecher in Einzelfällen Schäumen auf.

Bei der W i d m a r k - Methode wurde, wie es auch L i n d e (11) vorgeschlagen hat, zur Abdichtung in den Schliff des Kolbenhalses nach dem Einsetzen des Stopfens ein Tropfen destillierten Wassers gegeben und auch die Gummikappen nach Vorschrift E. W i d m a r k s (4) überzogen. Die Kolben ließen sich alle spielend leicht öffnen. Während der Zugabe von 25 ccm destillierten Wassers wurden sie ständig unter fließendem Leitungswasser abgekühlt. Die Beschickung der Kolben mit Dichromatschwefelsäure wurde mit der feststellbaren Glaspritze vorgenommen, nicht mit dem von H. K r i e b s (3) empfohlenen Hohn'schen Pipettierapparat.

2. Die einzelnen Versuche.

Der exakte Nachweis von Alkohol im Blut setzt voraus, daß man die Technik der einzelnen Verfahren voll und ganz beherrscht. Besonders bei der Widmark-Mikromethode kommt es genau darauf an, daß man immer unter denselben Bedingungen arbeitet. Nachdem ich mich in die Klauer-Makromethode und in die Widmark-Mikromethode gut eingearbeitet hatte, indem ich Standardlösungen bestimmte und Kontrollversuchsreihen am Blut ausführte, ging ich an die eigentlichen Versuche heran. Die beiden ersten Versuche galten allerdings mehr der Vergleichung der Ergebnisse, die getrennt mit den beiden Verfahren gewonnen wurden. Eben deshalb seien sie auch mit aufgeführt,

Versuch 1, Versuchsperson R. B., männl.

Körpergewicht: 62 kg; normales Frühstück;

Alkoholgabe: 10.00 Uhr 75 ccm Weinbrand (38%).

Blutentnahme: 11.45 Uhr 2 Venülen und 6 Kapillaren.

Es wurde sofort eine Makro- und eine Mikroprobe ausgeführt.

Die Blutalkoholkonzentration der Makroprobe betrug 0,28^{0/00}.

Die Blutalkoholkonzentration der Mikroprobe betrug 0,29^{0/00}.

Die zweite Blutprobe wurde bei Zimmertemperatur 24 Stunden aufbewahrt; die Kapillaren waren nicht verschlossen. Diesmal ergab

die Blutalkoholkonzentration der Makroprobe $0,19^{0/100}$,
die Blutalkoholkonzentration der Mikroprobe $0,19^{0/100}$.

Es war also bei der recht warmen Jahreszeit die Alkoholkonzentration beträchtlich gesunken. Die Ergebniswerte zwischen Makro- und Mikromethode zeigen jedoch eine sehr gute Übereinstimmung. Das frische Blut der ersten Makroprobe schäumte zu Beginn der Destillation etwas, jedoch nicht störend. Bei der zweiten trat überhaupt kein Schäumen auf.

Versuch 2, Versuchsperson H. M., männl.

Körpergewicht: 69 kg; normales Frühstück;

Alkoholgabe: 11,15 Uhr 100 ccm Weinbrand (38%).

Blutentnahme: 12,45 Uhr 1 Venüle und 2 Kapillaren.

Die Blutalkoholkonzentration der Makroprobe betrug $0,48^{0/100}$,

die Blutalkoholkonzentration der Mikroprobe betrug $0,49^{0/100}$.

Das Ergebnis ist also auch in beiden Proben praktisch wieder übereinstimmend.

Versuch 3, Versuchsperson M. B., weibl.

Körpergewicht: 55 kg; kleines Frühstück;

Alkoholgabe: 10.00 Uhr 100 ccm Weinbrand (38%).

Blutentnahme: 11.30 Uhr 2 Venülen.

Die Alkoholkonzentration im Vollblut betrug $0,64^{0/100}$,

„ „ „ Blutkuchen „ $0,32^{0/100}$,

„ „ „ Serum „ $0,84^{0/100}$.

Die Vollblutprobe wurde direkt verarbeitet. Das Blut für Serum- und Blutkuchenprobe wurde 24 Stunden im Eisschrank aufbewahrt, was nach anderen Versuchen keinerlei Änderung des Alkoholspiegels zur Folge hat. Der Blutkuchen wurde mit destilliertem Wasser auf Filterpapier leicht abgewaschen. Bei der Destillation schäumte er verhältnismäßig stark, so daß lange Zeit mit ganz schwachem Dampfstrahl die Destillation fortgeführt werden mußte. Trotzdem war, als mit der Destillation aufgehört wurde, der Kolbeninhalt noch ziemlich gelb-grau, nicht so dunkelgrau-schwarz, wie er gewöhnlich war. Eine Nachprüfung des Blutkuchens ergab, daß er auf dem Querschnitt im Zentrum noch ziemlich rot war. Es war also mit Sicherheit die Destillation nicht ganz zu Ende durchgeführt worden. Das erklärt auch die auffallend hohe Differenz der Kon-

zentrationen zwischen Vollblut und Blutkuchen. Vielleicht ist auch, trotz der flüchtigen Abspülung auf dem Filterpapier, ein Teil des Alkohols vom Filterpapier aufgelesen worden. Bei den folgenden Versuchen wurde der Blutkuchen deshalb nur noch auf einem Uhrgläschen abgespült. Diese Werte können also zur Vergleichung mit den anderen Werten dieser Art nicht verwandt werden. Ebenso auch nicht das Verhältnis Serum zu Blutkuchen, wohl aber das Verhältnis Serum zu Vollblut.

Versuch 4, Versuchsperson W. R., männl.

Körpergewicht: 70 kg; normales Frühstück;

Alkoholgabe: 10.00 Uhr 150 ccm Weinbrand.

Blutentnahme: 11.30 Uhr 2 Venülen.

Der Blutkuchen wurde auf einem Uhrgläschen nur leicht abgewaschen.

Die Alkoholkonzentration im Vollblut betrug $0,91^{0/100}$,

„ „ „ Blutkuchen „ $0,78^{0/100}$,

„ „ „ Serum „ $1,02^{0/100}$.

Obgleich der Blutkuchen eine Zeitlang schäumte, ließ die Destillation sich doch gut durchführen.

Versuch 5, Versuchsperson H. B., männl.

Körpergewicht: 59 kg; nüchtern;

Alkoholgabe: 10.00 Uhr 150 ccm Weinbrand.

Blutentnahme: 11.30 Uhr 2 Venülen.

Der Blutkuchen wurde etwa 3 Minuten lang sehr gut ausgewaschen.

Die Alkoholkonzentration im Vollblut betrug $1,72^{0/100}$,

„ „ „ Blutkuchen „ $1,21^{0/100}$,

„ „ „ Serum „ $2,03^{0/100}$.

Versuch 6, Versuchsperson Gr., männl.

Körpergewicht: 59 kg; normales Frühstück;

Alkoholgabe: 9.50 Uhr 200 ccm, 10.00 Uhr + 50 ccm Weinbrand.

Blutentnahme: 10.50 Uhr 2 Venülen.

Der Blutkuchen wurde 3 Minuten ausgewaschen.

Die Alkoholkonzentration im Vollblut betrug $1,47^{0/100}$,

„ „ „ Blutkuchen „ $1,20^{0/100}$,

„ „ „ Serum „ $1,81^{0/100}$.

Verfuch 7, Versuchsperson St., männl.

Körpergewicht: 70 kg; normales Frühstück;

Alkoholgabe: 9.50 Uhr 200 ccm, 10.00 Uhr + 50 ccm Weinbrand.

Blutentnahme: 10.50 Uhr 2 Venülen.

Der Blutkuchen wurde aufgeschnitten und mit Aqua dest. ausgewaschen.

Die Alkoholkonzentration im Vollblut betrug 1,21^{0/00},

„ „ „ Blutkuchen „ 0,67^{0/00},

„ „ „ Serum „ 1,35^{0/00}.

Der aufgeschnittene Blutkuchen ließ sich besser destillieren, als die vorhergehenden.

Verfuch 8, Versuchsperson M., männl.

Körpergewicht: 81 kg; reichliches Frühstück;

Alkoholgabe: 9.50 Uhr 200 ccm, 10.00 Uhr + 50 ccm Weinbrand:

Blutentnahme: 10.50 Uhr 2 Venülen.

Der Blutkuchen wurde leicht ausgewaschen.

Die Alkoholkonzentration im Vollblut betrug 1,45^{0/00},

„ „ „ Blutkuchen „ 1,28^{0/00},

„ „ „ Serum „ 1,90^{0/00}

Verfuch 9, Versuchsperson W. G., männl.

Körpergewicht: 77 kg; gutes Mittagessen;

Alkoholgabe: 14.00 Uhr 200 ccm Weinbrand.

Blutentnahme: 15.30 Uhr 2 Venülen.

Der Blutkuchen wurde aufgeschnitten und gut ausgewaschen.

Die Alkoholkonzentration im Vollblut betrug 0,59^{0/00},

„ „ „ Blutkuchen „ 0,40^{0/00}.

Bei diesem und den folgenden Versuchen wurde der Alkoholgehalt des Serums nicht mehr festgestellt.

Verfuch 10, Versuchsperson M. R., männl.

Körpergewicht 63 kg; gutes Mittagessen;

Alkoholgabe: 14.00 Uhr 200 ccm Weinbrand.

Blutentnahme: 15.45 Uhr 2 Venülen.

Der Blutkuchen wurde sehr gut ausgewaschen, 2—3 Minuten.

Die Alkoholkonzentration im Vollblut betrug 1,37^{0/00},

„ „ „ Blutkuchen „ 0,99^{0/00}.

Verfuch 11, Versuchsperson E. de B., weibl.

Körpergewicht: 51 kg; gutes Abendessen;

Alkoholgabe: 22.45 Uhr 210 ccm Weinbrand.

Blutentnahme: 24.00 Uhr 2 Venülen.

Der Blutkuchen wurde sehr gut abgewaschen.

Die Alkoholkonzentration im Vollblut betrug $0,75^{0/100}$,

„ „ „ Blutkuchen „ $0,30^{0/100}$.

Verfuch 12, Versuchsperson H. R., männl.

Körpergewicht: 77 kg; gutes Abendessen;

Alkoholgabe: 22.45 Uhr 300 ccm Weinbrand.

Blutentnahme: 24.00 Uhr 2 Venülen.

Der Blutkuchen wurde sehr gut abgewaschen.

Die Alkoholkonzentration im Vollblut betrug $0,93^{0/100}$,

„ „ „ Blutkuchen „ $0,33^{0/100}$.

Bei diesem und dem vorhergehenden Versuch fällt sofort die ungewöhnlich hohe Differenz der Konzentrationswerte auf. Die Blutproben wurden, nicht wie die bisherigen im Eischrank, sondern 12 Stunden in Zimmertemperatur aufbewahrt. Doch ist diese hohe Differenz nicht etwa, wie es wohl erst scheinen konnte, auf diesen Umstand zurückzuführen. Sie beruht lediglich auf demselben Fehler in der Destillation, wie auch in Versuch 3. Doch trat in diesen beiden Fällen ein noch viel stärkeres Schäumen bei der Destillation des Blutkuchens auf. Sie wurde mit ganz schwachem Dampfstrahl über eine Stunde lang durchgeführt und doch zeigte sich nach Beendigung, daß der Blutkuchen noch lange nicht genügend durchdestilliert war. Daher ist das Ergebnis dieser beiden Versuche, die zugleich ausgeführt wurden, nicht verwertbar.

Verfuch 13, Versuchsperson K. R., männl.

Körpergewicht: 65 kg; Mittagessen vor 6 Stunden.

Alkoholgabe: 18.00 Uhr 150 ccm Weinbrand.

Blutentnahme: 19.00 Uhr 2 Venülen.

Der Blutkuchen wurde aufgeschnitten und gut ausgewaschen.

Die Alkoholkonzentration im Vollblut betrug $0,67^{0/100}$,

„ „ „ Blutkuchen „ $0,42^{0/100}$.

Bei diesem Versuch wurden die Blutproben 15 Stunden bei Zimmertemperatur aufbewahrt. Ebenso bei den beiden nächstfolgenden Versuchen.

Verfuch 14, Versuchsperson G. B., weibl.

Körpergewicht: 55 kg; kleines Abendessen;

Alkoholgabe: 21.50 Uhr 210 ccm Weinbrand.

Blutentnahme: 23.00 Uhr 2 Venülen.

Der Blutkuchen wurde nur flüchtig abgewaschen.

Die Alkoholkonzentration im Vollblut betrug $0,56^{0/100}$,

„ „ „ Blutkuchen „ $0,49^{0/100}$

Verfuch 15, Versuchsperson D. de B., männl.

Körpergewicht: 73 kg; reichliches Abendessen;

Alkoholgabe: 21.50 Uhr 250 ccm Weinbrand.

Blutentnahme: 23.15 Uhr 2 Venülen.

Der Blutkuchen wurde 3 Minuten lang sehr gut ausgewaschen.

Die Alkoholkonzentration im Vollblut betrug $1,01^{0/100}$,

„ „ „ Blutkuchen „ $0,75^{0/100}$.

In den beiden letzten Versuchen schäumten die Blutkuchen bei der Destillation kaum. Eine Abhängigkeit des Schäumens von irgendwelchen Faktoren konnte nicht festgestellt werden.

3. Ergebnisse in Gruppen geordnet.

Um einen besseren Überblick über die Versuche zu erhalten, seien die Ergebnisse in Gruppen zusammengestellt. Zuerst sei insgesamt das Verhältnis von Vollblut zu Blutkuchen ins Auge gefaßt mit Ausschluß der oben genannten Fehlbestimmungen.

Verfuch	Vollblut	Blutkuchen	Verhältniszahl
4	$0,91^{0/100}$	$0,78^{0/100}$	1,17
5	$1,72^{0/100}$	$1,21^{0/100}$	1,42
6	$1,47^{0/100}$	$1,20^{0/100}$	1,23
7	$1,21^{0/100}$	$0,67^{0/100}$	1,81
8	$1,45^{0/100}$	$1,28^{0/100}$	1,13
9	$0,59^{0/100}$	$0,40^{0/100}$	1,48
10	$1,37^{0/100}$	$0,99^{0/100}$	1,38
13	$0,67^{0/100}$	$0,42^{0/100}$	1,60
14	$0,56^{0/100}$	$0,49^{0/100}$	1,14
15	$1,01^{0/100}$	$0,75^{0/100}$	1,35

Verhältnis von Vollblut : Blutkuchen im Mittel 1,37

Aus dieser Übersicht geht genau hervor, daß die Alkoholkonzentration im Vollblut stets höher liegt als die Alkoholkonzentra-

tion im Blutkuchen. Dabei schwankt das Verhältniß zwischen 1,13 und 1,81. Es fragt sich, ob man aus einer solch großen Schwankungsbreite das Mittel herausnehmen darf, das in diesem Falle 1,37 betragen würde. Wenn wir aber die verschiedenen Auswaschversuche mit dem Blutkuchen in Erwägung ziehen und bei der Beurteilung beachten, so ergeben sich folgende drei Gruppen:

Gruppe I

Blutkuchen aufgeschnitten, gut ausgewaschen.

Versuch	Vollblut	Blutkuchen	Verhältniszahl
7	1,21 ^{0/00}	0,67 ^{0/00}	1,81
9	0,59 ^{0/00}	0,40 ^{0/00}	1,48
13	0,67 ^{0/00}	0,42 ^{0/00}	1,60
Verhältnis im Mittel			1,63

Gruppe II

Blutkuchen 3—4 Minuten sehr gut ausgewaschen, aber nicht aufgeschnitten.

Versuch	Vollblut	Blutkuchen	Verhältniszahl
5	1,72 ^{0/00}	1,21 ^{0/00}	1,42
6	1,47 ^{0/00}	1,20 ^{0/00}	1,23
10	1,37 ^{0/00}	0,99 ^{0/00}	1,38
15	1,01 ^{0/00}	0,75 ^{0/00}	1,35
Verhältnis im Mittel			1,35

Gruppe III

Blutkuchen nur flüchtig abgewaschen.

Versuch	Vollblut	Blutkuchen	Verhältniszahl
4	0,91 ^{0/00}	0,78 ^{0/00}	1,17
8	1,45 ^{0/00}	1,28 ^{0/00}	1,13
14	0,56 ^{0/00}	0,49 ^{0/00}	1,14
Verhältnis im Mittel			1,15

Es zeigt sich also in Gruppe I, daß die Versuche mit den hohen Konzentrationsunterschieden (die infolgedessen auch die hohen Verhältniszahlen aufweisen) gerade die sind, in denen die Blutkuchen aufgeschnitten und gut ausgewaschen wurden. Diese Blutkuchen enthielten also die geringste Menge Alkohol, was sich ja auch aus der Behandlungsweise erklärt, da die Blutkuchen infolge des Aufschnei-

dens eine viel größere Oberfläche erhielten und so leichter einen Teil des Alkohols an die, wenn auch nur für ganz kurze Zeit, umspülende Flüssigkeit abgeben konnten.

In Gruppe III finden wir die Versuche mit den extrem niederen Verhältniszahlen wieder. Bei diesen Versuchen wurden die Blutkuchen nur ganz flüchtig mit destilliertem Wasser überspült. Es war praktisch keine Möglichkeit gegeben, Alkohol an die umgebende Spülflüssigkeit abzugeben. Es erklären sich aber gerade die hohen Konzentrationswerte dieser Blutkuchen aus der Möglichkeit, daß sie noch einen Teil Serum enthielten, in dem, wie wir sehen werden, die Konzentration am höchsten ist.

Nach Ausscheiden dieser beiden Extremwertgruppen bleibt die Gruppe II, die die mittleren Verhältniswerte birgt. Bei dieser Auswasmethode, bei der dem Blutkuchen nicht sehr zugesetzt, andererseits aber eine ausreichende Abspülung gewährleistet wird, dürfte man praktisch dem wirklichen Alkoholgehalt des Blutkuchens am nächsten kommen. Die Schwankungsbreite von 1,23—1,42 ist nicht sehr groß und es ergibt sich als Mittel 1,35, was dem Mittel 1,37 von der gesamten Untersuchungsreihe auffallenderweise wiederum sehr nahe kommt.

Man darf jedenfalls den Verhältniswert von 1,35 von Vollblut zu Blutkuchen vorerst noch nicht als konstant ansehen, es sei denn, er würde durch Nachuntersuchungen an größerem Material erhärtet.

Betrachten wir die Konzentrationswerte für Serum und Vollblut an folgender Tabelle:

Versuch	Serum	Vollblut	Verhältniszahl
3	0,84 ^{0/00}	0,64 ^{0/00}	1,31
4	1,02 ^{0/00}	0,91 ^{0/00}	1,12
5	2,03 ^{0/00}	1,72 ^{0/00}	1,18
6	1,81 ^{0/00}	1,47 ^{0/00}	1,23
7	1,35 ^{0/00}	1,21 ^{0/00}	1,12
8	1,90 ^{0/00}	1,45 ^{0/00}	1,31

Verhältnis von Serum : Vollblut im Mittel 1,21

Im Serum ist immer eine höhere Konzentration vorhanden als im Vollblut. Die Verhältniswerte schwanken zwischen 1,12—1,31.

Im Mittel ergaben sie die Verhältniszahl von 1,21. Dies bedeutet eine Nachprüfung und Bestätigung der von H. E l b e l (9) gefundenen Verhältniszahl von 1,20 im Mittel.

Es sei noch das Verhalten der Konzentrationswerte von Serum und Blutkuchen in nachfolgender Tabelle dargestellt:


Verfuch	Serum	Blutkuchen	Verhältniszahl
4	1,02 ^{0/00}	0,78 ^{0/00}	1,31
5	2,03 ^{0/00}	1,21 ^{0/00}	1,68
6	1,81 ^{0/00}	1,20 ^{0/00}	1,51
7	1,35 ^{0/00}	0,67 ^{0/00}	2,01
8	1,90 ^{0/00}	1,28 ^{0/00}	1,48

Verhältnis von Serum : Blutkuchen im Mittel 1,60.

Die große Schwankungsbreite der Verhältniswerte von 1,31 bis 2,01 ist natürlich zu erklären, wenn man die verschieden zu bewertenden Blutkuchenwerte in Betracht zieht. Es dürften dann wohl nur die Versuche 5 und 6 mit den praktisch wohl richtigsten Blutkuchenwerten herangezogen werden. Rein zufällig ergibt sich auch hier ein Verhältnismittel von 1,60. Doch ist die Grundlage hier bei weitem zu klein, um mehr als Vermutungsschlüsse zu ziehen.

Wie sich die Alkoholwerte von Serum, Vollblut und Blutkuchen gemäß den gefundenen Verhältniswerten zueinander verhalten, läßt sich an einem Dreieck darstellen, bei dem die Seiten die Alkoholkonzentrationen wiedergeben. Dabei sei 1^{0/00} = 10 cm. Als „Normales Blutalkoholdreieck“ sei dasjenige Dreieck bezeichnet, bei dem die Vollblutalkoholkonzentration 1^{0/00} beträgt. Dann ist die Serum-Alkoholkonzentration 1,21^{0/00} und die Blutkuchen-Alkoholkonzentration 0,74^{0/00} gemäß den gefundenen Verhältniswerten 1,21 bzw. 1,35.

Ist also der Wert einer Seite z. B. der Alkoholgehalt im Blutkuchen $\approx 0,96\text{‰}$ experimentell gefunden, so lassen sich die beiden anderen Werte einfach graphisch bestimmen: 9,6 cm werden genommen und parallel der im Winkel zur Grundlinie (Vollblut-Seite) festliegenden Blutkuchen-Seite verschoben, bis die Vollblut- und Serum-Seite, oder wie hier ihre Verlängerungen, geschnitten werden. Die Seitenlängen des neu entstandenen kongruenten Dreiecks geben dann direkt die Alkoholkonzentrationswerte im Vollblut ($1,30\text{‰}$) und im Serum ($1,57\text{‰}$) wieder. Hat man die Alkoholkonzentration im Serum experimentell bestimmt, so lassen sich umgekehrt die Werte für Blutkuchen und Vollblut sofort finden.



C. Praktische Verwertbarkeit der Ergebnisse.

Die ausgeführten Versuche haben gezeigt, daß die Alkoholkonzentration beim geronnenen Blute im Serum stets höher ist als im Blutkuchen, daß der Alkoholgehalt im Serum aber auch stets höher liegt als im Vollblut. Der Alkoholgehalt des Blutkuchens scheint in gewissem Maße davon abhängig zu sein, wie weit im Blutkuchen noch Serum vorhanden ist, wie die Auswaschungsversuche zeigen. Im übrigen dürften aber auch noch physiologische Faktoren den Alkoholgehalt des Blutkuchens mitbestimmen, sowohl bei der Gerinnung selbst als auch in der Zusammensetzung des Blutes, die z. B. vor und nach einer Mahlzeit verschieden ist. Das Verhältnis der Alkoholwerte von Vollblut zu Blutkuchen ist nicht konstant genug, daß man aus dem Alkoholgehalt des Blutkuchens den des Vollblutes berechnen darf. Trotzdem wäre es denkbar, daß man in einzelnen Fällen auf den Blutkuchenwert zurückgreifen müßte. Die Verhältniszahl 1,35 bietet dann immerhin einen Anhaltspunkt.

Bei weitem konstanter ist das Verhältnis der Konzentrationswerte von Serum zu Vollblut. Es ist zudem besser fundamentiert, hat doch auch H. Elbel (9) in seinen Versuchen denselben Verhältniswert gefunden. Dieser Verhältniswert entspricht auch dem von E. Widmark (4) schon untersuchten Verhältnis von Blutplasma zum Vollblut 1,15—1,20 und dem Verhältnis Harn zu Blut 1,20 (E. Widmark) (12). In diesem Zusammenhang ist es interessant, auch darauf hinzuweisen, daß Linde (11) die Alkoholwerte von Parotispeichel und Vollblut untersucht hat. Dabei fand er, daß der Alkoholgehalt des Speichels stets höher ist als der des Vollblutes, und das Verhältnis im Mittel auch 1,20 beträgt. Man darf wohl annehmen, daß nach eingetretenem Diffusionsgleichgewicht die „Körperflüssigkeiten“ im allgemeinen einen um 20% höheren Alkoholgehalt aufweisen als das Blut.

Man wird den Alkoholgehalt des Serums stets zu Paralleluntersuchungen verwenden dürfen. Es erhebt sich die Frage, ob man aus dem Serum allein die Blutalkoholkonzentration bestimmen und in

der gerichtsmedizinischen Praxis bei der Beurteilung von Raufchuständen verwenden darf. Die Untersuchungsergebnisse sprechen dafür. Wenn man dazu noch in Betracht zieht, daß auch aus dem Vollblutwert der Berauschungsgrad immerhin nur gemutmaßt wird und vielleicht dem schematischen Normalfall, selten aber dem tatsächlichen Einzelfall vollkommen gerecht wird, daß andererseits in jedem Fall auch die klinisch-psychische Untersuchung der Beurteilung zugrunde gelegt werden soll, dann darf man wohl auch den Serumwert als Ausgangspunkt bei der Beurteilung verwenden.

Es würde sich dann auch der Streit, ob man die Polizeistationen mit Venülen oder Kapillaren ausrüsten soll, zugunsten der Venüle entscheiden (wofür J. Koller (10) ja schon seit langem energisch eintritt), da man das Serum ja nur aus dem geronnenen Blut der Venüle praktisch am besten gewinnt. Es hat diese Methode noch den Vorteil, daß man das Untersuchungsmaterial nur zum geringsten Teil verbraucht, so daß man mit dem übrigen Blut immer einen Parallelversuch machen und unter Umständen es auch auf andere flüchtige, reduzierende Substanzen qualitativ untersuchen kann. Man kann schließlich in allen Fällen bei geronnenem wie auch ungeronnenem Blute (wie bisher) mit der Widmark-Methode (4) allein auskommen. Obschon die Blutentnahme mit der Kapillare selbst von geschickten Laien ausgeführt werden könnte, hat sich allgemein gezeigt, daß die Ärzte lieber mit der Venüle arbeiten und der Kapillare nicht recht zugänglich sind. Wenn es dann trotzdem, wie oben schon gesagt, auch vorkommt, daß eine Venüle mit kaum einem Kubikzentimeter geronnenem Blut eingefandt wird, so lassen sich immerhin zwei Kapillaren mit dem vorhandenen Serum füllen und über das Serum die Blutalkoholkonzentration bestimmen.

Bei der hohen Bedeutung, die dem Nachweis von Alkohol im Blut oder im Serum zukommt, ist daher zu fordern, daß möglichst bei allen Unfällen, bei denen irgendwie der Alkohol eine Rolle gespielt hat oder im weiteren Verlaufe spielen könnte, Blutproben mit der Venüle entnommen werden und zur Untersuchung an geeignete Institute eingefandt werden. In diesem Zusammenhang und dem oben erwähnten Bestreben, alle Staatspolizeiamter

und Polizeistationen einheitlich mit Venülen zu versehen, sei hier noch darauf hingewiesen, daß der Blutentnahme eines Menschen, auch gegen seinen Willen, keine rechtlichen Bedenken mehr im Wege stehen, seit es in dem „Ausführungsgesetz zum Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 24. 11. 1933“ im § 81a zum erstenmal im St.G.B. heißt: „daß Entnahme von Blutproben und andere Eingriffe, die nach den Regeln der ärztlichen Kunst zu Untersuchungszwecken vorgenommen werden, ohne Einwilligung des zu Untersuchenden vorgenommen werden können, wenn kein Nachteil für seine Gefundheit zu beforgen ist. Die Anordnung steht dem Richter, bei Gefahr im Verzuge auch der Staatsanwaltschaft und den Polizei- und Sicherheitsbeamten zu, die als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft ihren Anordnungen Folge zu leisten haben.“ Da bei Verkehrsunfällen z. B. insofern Gefahr im Verzuge ist, als bei zu später Blutentnahme kein Alkohol mehr im Blute nachweisbar wäre, so ist also jeder Polizeibeamter berechtigt, eine Blutentnahme anzuordnen.

Zusammenfassend kann also gesagt werden: Die ausgeführten Versuche haben ergeben, daß die Alkoholkonzentration vom Vollblut und Blutkuchen in einem Verhältnis zueinander stehen, das im Mittel 1,35 beträgt. Doch ist dieser Verhältniswert nicht konstant genug, um aus dem Blutkuchen die Vollblutalkoholkonzentration in der Regel zu erschließen. Dagegen ist das Verhältnis der Alkoholgehalte von Serum zu Vollblut mit einem Wert von 1,20 konstant. Man kann also nicht nur das Serum zu Parallelbestimmungen verwenden, sondern auch dieses allein beim Nachweis von Alkohol im Blut zur Grundlage der Bestimmung machen; das Ergebnis muß dann durch die Konstante 1,20 dividiert werden. Die so erhaltene Blutalkoholkonzentration kann bei der Beurteilung von Rauschzuständen in der Praxis angewandt werden.

Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prof. Dr. Pietrusky für die Überlassung des Themas und Herrn Dr. phil. Künkele für die freundliche Beratung bei der Anfertigung der Arbeit meinen herzlichen Dank auszusprechen.

Schrifttum.

- Elbel, H. (9): Untersuchungen zur Verwertbarkeit der Blutalkoholbestimmungen nach Widmark. Dt. Ztschr. f. gerichtl. Medizin 1935 Bd. 25 S. 124.
- Goebel, F. (2): Über die Feststellung der Angetrunkenheit oder Betrunketheit bei Alkoholdelikten. Med. Welt 1934 S. 706—707.
- Jungmichel, G. (5): Alkoholbestimmung im Blut. Methodik und forensische Bedeutung. Carl Heymanns Verlag, Berlin 1933.
- (1): Über die Bedeutung der Alkoholbestimmung im Blut für die forensische und klinische Medizin. Sonderdruck aus der Münch. Med. Wchschr. 1935 Nr. 10 S. 365.
- Klauer, H. (7): Bestimmung von Alkohol im Blut und Gehirn. Dt. Ztschr. f. gerichtl. Med. 1931 Bd. 17 S. 89.
- Koller, J. (10): Unsere Erfahrung über die Blutentnahme zum Blutalkoholnachweis und ein technischer Vorschlag zur einheitlichen Durchführung desselben. Münch. M. Wchschr. 1935 Nr. 14 S. 541.
- Kriebs, R. (3): Der Nachweis von Alkohol im Blut nach Widmark und seine Bedeutung für die gerichtliche Beurteilung von Verkehrsunfällen. Verlag „Auf der Wacht“ Berlin-Dahlem, 1934.
- Linde, (11): Der Übergang des Äthylalkohols in den Parotispeichel beim Menschen. Arch. f. exp. Pathol. Bd. 167 S. 285.
- Mayer, R. M. (8): Zur Methodik der Alkoholbestimmung. Dt. Ztschr. f. gerichtl. Med. Bd. 18 S. 638.
- Nicolai, H. W. (6): Die Methodik der Alkoholbestimmung in P. Fränkel und H. W. Nicolai: Der Alkoholgehalt im Blut und in den Organen. Dt. Ztschr. f. gerichtl. Med. Bd. 11, S. 134 1928.
- Widmark, E. (4): Die theoretischen Grundlagen und die praktische Verwertbarkeit der gerichtlich-medizinischen Alkoholbestimmung. Urban und Schwarzenberg, Berlin-Wien 1932.
- (12): Zur Frage nach dem Übergang des Alkohols in den Harn durch Diffusion. Biochem. Ztschr. Bd. 213 S. 445.
-

Lebenslauf.

Am 10. April 1909 wurde ich, Rudolf Balenfiefen, als Sohn des Sattler- und Polstermeisters Peter Balenfiefen und seiner Ehefrau Franziska geb. Winggen in Eudenbach (Siegburgkreis) geboren. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte ich eine kaufmännische Privatschule und war anschließend ein Jahr lang im Großhandel tätig. Nach 5jährigem Besuch der höheren Schule legte ich dann Ostern 1931 die Reifeprüfung am humanistischen Gymnasium in Siegburg ab. Ich wandte mich dann dem Studium der Medizin zu. Das Physikum bestand ich nach 5 Semestern in Köln im Juli 1933. Von den klinischen Semestern studierte ich 1 Semester in Köln, 1 Semester in München und 4 Semester in Bonn. Am 15. Dezember 1936 bestand ich in Bonn mein medizinisches Staatsexamen.
